AVERTISSEMENTS

AGRICOLES

DLP 19-5-71 187269

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE :

ÉDITION DE LA STATION CHAMPAGNE

(ARDENNES, AUBE, HAUTE-MARNE, MARNE)

Villa Blanche - 62, Rte Nationale - La Neuvillette, 51-REIMS - Tél. 47.22.87 47.13.82

ABONNEMENT ANNUEL: 25 F C.C.P. CHALONS-sur-MARNE 2.800.67 W

Régisseur de Recettes de la Direction Départementale de l'Agriculture à Châlons-sur-Marne

SUPPLEMENT Nº 4 AU BULLETIN Nº 128 DE MAI 1971

18 mai 1971/nº 13

ARBRES FRUITIERS

<u>Tavelure pommier-poirier</u>: Notre avis du 12 mai recommandait un renouvellement du traitement en fonction de l'importance des pluies à venir. Les précipitations orageuses du 14-15-16 mai supérieures à 20 mm imposaient cette nouvelle protection, urgente.

L'importance des captures d'ascospores en nature, réalisées le 15 et 16 mai montre que de nouvelles contaminations graves ont pu avoir lieu dans des vergers insuffisament protégés. Compte tenu des températures élevées et de leur persistance, les arbres devront être particulièrement hien protégés durant la période du 26 au 30 mai, dates auxquelles de nouvelles taches sont susceptibles d'apparaître dans les vergers.

Oïdium: le temps reste favorable à ce champignon.

RAPPEL: Pucerons: à surveiller

Monilia des cerisiers, pruniers : la protection doit être maintenue, en particulier sur les griottes.

Araignées rouges: dans les seuls vergers où les pontes d'hiver étaient importantes renouveler le traitement dans les jours à venir.

GRANDE CULTURE

Mildiou de la pomme de terre : La période de pluies intenses que nous subissons a suivi de peu la levée généralisée des pommes de terre qui a été excessivement rapide.

Il y a lieu de remarquer que ces précipitations sont très variables suivant les secteurs et même les terroirs : de l'ordre de 10 à 100 mm depuis le 13 mai.

Compte tenu de l'état de sécheresse des sols les précipitations de l'ordre de 30 mm ont été rapidement ressuyées et ne posent pas de problème.

Pour les variétés de consommation et les variétés féculières au feuillage sensible à la maladie, un traitement s'impose avant le 25 mai :

- dans les cultures ayant subi des inondations ("ronds" dans les pièces ou "bas" inondés)
- dans les cultures ayant reçu plus de 30 mm et situées dans des zones favorables au mildiou soit de par leur situation, soit de par l'intensité des cultures qui y sont faites.

<u>Pégomyie-Puceron noir de la betterave</u>: Les récentes précipitations ont amené une régression de ces parasités par lessivage des feuilles ; la pousse des betteraves est maintenant très active.

Il n'y a donc pas à envisager dans l'immédiat de nouvelles interventions sauf dans les rares zones peu intéressées par les pluies de ces derniers jours et où il convient de rester vigilant.

Les Contrôleurs chargés des Avertissements Agricoles, H. de MEIRLEINE - A. GODIN.

l'Inspecteur de la Circonscription Phytosanitaire CHAMPAGNE, J. DELATTRE.